

VACCINE	BIRTH	2 MO	4 MO	6 MO	12 MO	15 MO	18 MO	4-6 YRS	9 YRS	11-12 YRS	16-18 YRS
Hepatitis (HEP B)	1st dose	2nd dose	3rd dose	4th dose							
RotaTeq (3-DOSE Series)		1st dose	2nd dose	3rd dose							
Diphtheria, Tetanus, Pertussis (DTaP)		1st dose	2nd dose	3rd dose		4th dose		5th dose			
Tetanus, Diphtheria, Pertussis (Tdap)										1st dose	
Haemophilus Influenza (Hib)		1st dose	2nd dose	3rd dose		4th dose					
Pneumococcal (PVC)		1st dose	2nd dose	3rd dose	4th dose						
Inactivated Poliovirus (IPV)		1st dose	2nd dose	3rd dose				4th dose			
Measles, Mumps, Rubella (MMR)					1st dose			2nd dose			
Varicella (VAR)					1st dose			2nd dose			
Hepatitis (HEP A)					1st dose		2nd dose				
Gardasil/Human Papillomavirus (HPV)									1st dose*		
Meningococcal (1 dose + Booster)										1st dose	Booster
Bexsero (Meningococcal B)											1st dose*

See Tylenol and Motrin dosing for fever after immunizations. **\*NO Motrin given to infants 6 mo and younger ONLY Tylenol\***

FLU- (6mo-36mo) they will get a 2 part series 1st one at 6 mo then the second one 1 mo later. They can get it later just needs to be within the 6-36 mo

HPV\*- 1st dose, 2nd dose is 2 mo later, 3rd dose is 4 mo later from 2nd dose (do not need to start over if the patient is late on getting the next shot)

TDaP- 10yrs without injury, 5 yrs with injury (and with every pregnancy)

Pediarix- Includes: DTaP, Polio, Heb B (Hib and PVC will be separate). This is given at 2 mo, 4 mo, and 6 mo

Kinrix- Includes: DTaP and Polio. This is given at 4-6 yrs

Bexsero\* 2 dose series will get 2nd dose 1 month later

RotaTeq- is an oral immunization

Hepatitis A- Needs to be 6 months apart

VACUNA	Nacimiento	2 M	4 M	6 M	12 M	15 M	18 M	4-6 Años	9 Años	11-12 Años	16-18 Años
Hepatitis (HEP B)	1.º dosis	2.º dosis	3.ª dosis	4.ª dosis							
Rotavirus (Serie de 3 Dosis)		1.º dosis	2.º dosis	3.ª dosis							
Difteria, Tétanos, Tosferina (DTaP)		1.º dosis	2.º dosis	3.ª dosis		4.ª dosis		5.ª dosis			
Tétanos, Difteria, Tosferina (Tdap)										1.º dosis	
Haemophilus influenzae tipo B		1.º dosis	2.º dosis	3.ª dosis		4.ª dosis					
Neumocócica (PVC)		1.º dosis	2.º dosis	3.ª dosis	4.ª dosis						
Poliovirus Inactivos (IPV)		1.º dosis	2.º dosis	3.ª dosis				4.ª dosis			
Paperas, Sarampión, Rubéola (MMR)					1.º dosis			2.º dosis			
Varicela (VAR)					1.º dosis			2.º dosis			
Hepatitis (HEP A)					1.º dosis		2.º dosis				
Virus del Papiloma Humano (HPV)									1.º dosis*		
Neisseria Meningitidis (1.a dosis + Refuerzo)										1.º dosis	Refuerzo
Bexsero (Meningococo B)											1.º dosis*

Ve la medicación de Motrin y Tylenol para la fiebre después de inmunizaciones. \*NINGÚN Motrin dado a niños menores de 6 MESES, SÓLO Tylenol\*

Gripe- (6m-36m) obtendrán una serie de 2 dosis, la primera dosis a los 6 meses después la segunda 1 mes después. Pueden hacerlo después de un mes, solo tiene que estar dentro de las 6-36 mo

HPV\* 1ª dosis, 2ª dosis es 2 meses más tarde, 3ª dosis es de 4 meses después de 2ª dosis (no es necesario empezar de nuevo si el paciente no la recibe actualmente para conseguir el siguiente tiro)

TDaP - 10 años sin lesión, 5 años con lesiones (y con cada embarazo)

Pediarix-incluye: DTPA, Polio, Heb B (Hib y PVC será separado). 2 meses, 4 meses, 6 meses

Kinrix-incluye: DTPA, Polio. Entre los 4 a 6 años

Bexsero\* 2 series de la dosis conseguirá la 2da dosis 1 mes más tarde

Rotatex-es una inmunización oral

La Hepatitis A- Se debe dar 6 meses aparte